

本院不宜磨碎給藥之藥品

在臨床應用上，常因病患的特殊狀況，如以鼻胃管進食、小兒科患者作劑量調整者，須將藥品搗碎或剝半以利其給藥。但對於酸性下不穩定、易刺激胃黏膜而作成腸衣錠、以舌下途徑給藥者、或為使藥品持續穩定釋放而作成之持續釋放錠等劑型，如以磨碎給藥後，有可能造成藥效無法發揮或局部血中濃度過高導致毒性反應過高，因此不宜磨碎給藥。

(依英文字母順序)

商品名	藥物成份 及劑量	劑型	正確服用	不宜磨粉 原因
Augmentin Tab	Amoxicillin 250mg Clavulanic acid 125mg	膜衣錠	整粒吞服 或使用前才磨粉並立即使用	易潮解，容易變黃
Antibiophilus Cap	Lactobacillus	膠囊	整粒吞服或打開膠囊	易潮解
Betaloc Zok	Metoprolol 100mg/Tab	緩釋錠	整粒或半顆之錠劑，可以剝半服用，但 不宜磨粉或嚼碎	控釋錠劑型藥物，磨粉後會破壞原本的 劑型
Espin E.M	Aspirin 100 mg/Cap	腸溶微粒膠囊	整粒吞服 或打開膠囊直接管灌	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(腸溶微 粒)，造成藥品受到胃酸破壞或引起胃 腸道刺激
Fenogal 200mg Lidose	Fenofibrate 200 mg/cap	膠囊	整粒吞服， 不可磨粉或嚼碎	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(半固體 脂質狀藥物)。
Infloran	Lactobacillus Bifidobacterium	膠囊	整粒吞服或打開膠囊	易潮解，需冷藏藥品
Glucophage Tab	Metformin hydrochloride 500mg/Tab	膜衣錠	請整錠吞服不要咀嚼	藥物磨粉後會破壞原本的劑型
Minlife-P Sustained tab	Loratadine 5 mg Pseudoephedrine 120 mg	持續性藥效錠 (子母錠)	整粒吞服 不可剝半或嚼碎	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(持續性 藥效錠)，喪失藥物長效作用或導致藥 物劑量全部釋出
Vesicare Tab	Solifenacin succinate 5 mg/tab	膜衣錠	整粒吞服	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(長效膜 衣錠)且味苦
Promone Cap	Progesterone 100 mg/Cap	微粒化軟膠囊	整粒吞服	內含油狀物
Premarin Tab	Conjugated estrogen 0.625 mg/Tab	錠劑	整粒吞服，請勿切開、壓碎咀嚼或含在 口中溶解	接合型錠劑會緩慢釋出
Xanthium	Theophylline 200 mg/cap	持續性藥效膠 囊	整粒吞服，不可磨粉或嚼碎，但可分 包。(勿打開或壓碎膠囊內微細顆粒)	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(持續性 藥效膠囊)，喪失藥物長效作用或導致 藥物劑量全部釋出。

註：Xanthium 可分包，電腦設定未強制管控，其餘均設成不可磨粉。

修訂日 108.08.15