

# 臺安醫院需冷藏藥品

修訂日期 110/07/21

一. 疫苗名稱 (商品名)	單位	溫度	注意事項
A 型肝炎疫苗(VAQTA)(MSD)	0.5 mL/Vial	2~8 °C , up to 25°C : 88hrs(USA) 、 72hrs(Canada)	勿冷凍
B 型肝炎疫苗(ENGERIX-B)(GSK)	20 mcg/mL/Vial	2~8 °C , 22~25°C :for month 37°C :1 month , 45°C :1 week	2~8 °C, 勿冷凍
破傷風類毒素(Tetanus Toxoid)	0.5mL/Vial	2~8 °C	2~8 °C, 勿冷凍
白喉. 百日咳. 破傷風疫苗(GSK) (補施追疫苗 Boostrix)	0.5mL/Vial	2~8 °C , 8~25°C :168hrs	勿冷凍
白喉. 百日咳. 破傷風. 小兒麻痺疫 苗 (四合一疫苗)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
白喉. 百日咳. 破傷風 B 型嗜血桿菌. 小兒麻痺疫苗 (五合一疫苗)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
卡介苗 (B. C. G)	3 mL/Vial	8 °C 以下 , 0~8°C :1 year 22~25°C :stability (20~30%loss:3month) 35~37°C :stability (20%loss:3~14days) over 37°C :unstable	高溫效價驟減, 稀釋後 2 小時內用完, 並保冷 2~4 °C, 稀釋液超過 25 °C 役 使疫苗凝集及效價降低
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 (Prevenar13)	0.5 mL/Vial	2~8 °C <25°C :4 days	勿冷凍, 不超過 25°C 可 維持 4 天
多價性肺炎鏈球菌疫苗 (Pneumovax23)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍, 置於室溫 1 個月
水痘疫苗 (Varilrix)(GSK)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存, 稀釋劑可儲存 於冷藏或室溫
水痘疫苗 (Varivax)(MSD)	0.5 mL/Vial	2~8 °C 或更低溫	避光貯存, 也可儲存於冷 凍庫, 一旦移至冷藏庫即 不應再次冷凍, 與稀釋液 混合後 30 分鐘內使用完
四價感冒疫苗 Fluarix Tetra	0.5 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存
麻疹. 德國麻疹. 腮腺炎 (MMR)	0.5 mL/Vial	2~8 °C Up to 25°C :6hrs (USA, Canada)	避光貯存, 勿冷凍, 稀釋 後於 8 小時內使用完
日本腦炎疫苗 (Japanese Encephalitis Vaccin	1 mL/vial	2~10°C 2~8°C :1yr(52weeks 效價掉 4.7%)	避光貯存, 勿冷凍

		22~25°C :20weeks(20 weeks 效價掉 8.7%) 35~37°C :6weeks(18 weeks 效價掉 14%)	
2 價人類乳突病毒基因重組疫苗 (GSK) (Cervarix)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存, 勿冷凍, 8~25 °C 溫度下可維持 3 天, 25~37 °C 可 1 天
9 價人類乳突病毒基因重組疫苗 (MSD)(Gardasil)	0.5 mL/Vial	2~8 °C 20°C~25°C :72hrs >25°C :72hrs(USA)	避光貯存, 勿冷 凍, 8~25°C 不超過 72 小 時
輪狀病毒疫苗口服懸液劑 Rotarix 羅特律(GSK)	1.5 mL/Bot	2~8 °C 8~25 °C :72hrs 8~37 °C 24hrs	勿冷凍, 避光貯存
口服活性 5 價輪狀病毒疫苗 (RotaTeq)(MSD)	2 mL/Bot	2~8 °C (有效期限 24 個月)	避光貯存
<i>COVID-19 &lt;AstraZeneca&gt;</i>	<i>5 mL/Vial</i>	<i>2~8 °C</i>	<i>開封後 30°C 不可超過 6 小時</i>
<i>Moderna COVID-19</i>	<i>0.5 mL/Dose</i>	<i>未開封-25°C~-15 °C 冷凍 保存 7 個月, 避免光照。 2~8 °C 30 天。未開封從 冷藏取出後, 室溫保存 8~25 °C 為 12 小時</i>	<i>一旦解凍不可再次冷 凍。首次抽液體後 2~25 °C, 可維持 6 小時</i>
<b>二 . 荷爾蒙製劑 (商品名)</b>	<b>單位</b>	<b>溫度</b>	<b>注意事項</b>
PG-E2 V. T	3 mg/Tab	2~8 °C	包裝拆封後於 6 個月內 使用
Methylethergometrine 0.2mg/Amp	0.2 mg/Amp	25°C 以下	無冷藏且 <25°C 可存放 14 天, 避免冷凍
Regular Insulin (HUMULIN-R)	1000 IU/ 10mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍, 避免陽光直射一 旦使用, 可最多於 28 天 內使用.
<b>三 . 血清製劑 (商品名)</b>	<b>單位</b>	<b>溫度</b>	<b>注意事項</b>
B 型肝炎免疫球蛋白注射液 (HBIG)	0.5 mL/syr	2~8 °C 30 °C :10.5 天 40 °C :3.5 天	勿冷凍
抗 RH 因子球蛋白注射液(Hyper RHO)	1500 IU/syr	2~8 °C	勿冷凍
<b>四 . 口服益生菌 (商品名)</b>	<b>單位</b>	<b>溫度</b>	<b>注意事項</b>
益腹寧 Infloran Berna	20 粒/BOX	2~8 °C 22°C :for week	在室溫 25 °C 可維持至少 一個月活性
優芮珂絲 U-relax	28 粒/BOX	25°C 以下	避免陽光直射, 存放於陰 涼處
<b>五 . 泡製後口服抗生素懸浮液</b>	<b>單位</b>	<b>溫度</b>	<b>注意事項</b>
Amoxilline & Clavulanic acid	457 mg/5mL, 35	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 7

(Augmentin) suspension	ml/Bot		天
Amoxicillin (Amolin) suspension	25 mg/mL, 60 mL/Bot	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 7 天
Azithromycin (Zithromax) suspension	15 mL/ Bot	30°C 以下	泡製後於室溫可存放 5 天
<b>六 . 其它藥品</b>	<b>單位</b>	<b>溫度</b>	<b>注意事項</b>
Atracurium Besylate 警 inj	25mg/2.5mL/Amp	2~8 °C	只允許在運途中或短期離開冷藏室而暫存於溫度高達 25 °C 地方, 如果在 25 °C 存放一個月則藥效減少 5%
<i>Cisatracurium Besylate 警 inj</i>	<i>2mg/mL/Amp</i>	<i>請儲存於冰箱冷藏 2-8 °C。避光。不可冷凍</i>	<i>以輸注液調配於 5 及 25 °C 能維持 24 小時, 用前才進行稀釋, 且配製後要儘快使用。</i>
Prolia®(Denosumab)	60mg/syr.	2~8 °C	施打前保留原始包裝盒下自然回溫(不可超過 25°C)一但自冰箱取出不可暴露超過 25°C 以上溫度, 必須於 14 天內使用, 若未在 14 天內使用應將 Prolia®拋棄, 避免接觸光源及熱源
Hyalobarrier CS	10mL/Vial	2~8 °C	2~8 °C 24 小時內使用
Hyalobarrier LAP	10mL/Vial	2~8 °C	2~8 °C 24 小時內使用