



101年9月  
第四卷 第二期

# 臺安醫院藥訊

Tai-An Hospital Drug Bulletin

發行人: 蘇主恩 主編: 蕭秀煜 編輯: 藥劑科編委會  
中華民國 98 年 5 月創刊

## 本院不宜磨粉給藥之藥品

廖翎奴藥師

### 本期內容

- 1.本院不宜磨粉給藥之藥品
- 2.用藥指導單: Carbamazepine

在臨床應用上，常因病患的特殊狀況，如以鼻胃管進食、小兒科患者作劑量調整者，須將藥品搗碎或剝半以利其給藥。但對於酸性下不穩定、易刺激胃黏膜而作成腸衣錠、以舌下途徑給藥者、或為使藥品持續穩定釋放而作成之持續釋放錠等劑型，如以磨碎給藥後，有可能造成藥效無法發揮或局部血中濃度過高導致毒性反應過高，因此不宜磨碎給藥。

(依英文字母順序)

商品名	藥物成份及劑量	劑型	正確服用	不宜磨粉原因
Augmentin tab	Amoxicillin 250mg Clavulanic acid 125mg	膜衣錠	整粒吞服 或使用前才磨粉並立即使用	易潮解，容易變黃
Antibiophilus cap	Lactobacillus	膠囊	整粒吞服或打開膠囊	易潮解
Ajulata	Nifedipine 10 mg/cap	軟膠囊	整粒吞服或咬破含於舌下	內含油狀物
Espin E.M	Aspirin 100 mg/Cap	腸溶微粒膠囊	整粒吞服 或打開膠囊直接管灌	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(腸溶微粒)，造成藥品受到胃酸破壞或引起胃腸道刺激
Fenogal 200mg Lidose	Fenofibrate 200 mg/cap	膠囊	整粒吞服，不可磨粉或嚼碎	藥物磨粉後會破壞原本的劑型(半固體脂質狀藥物)。
Infloran	Lactobacillus Bifidobacterium	膠囊	整粒吞服或打開膠囊	易潮解，需冷藏藥品

Lacipil	Lacipine 4 mg/tab	錠劑	整粒吞服， 不可磨粉但可剝半	需避光儲存(剝半需放 於鋁箔片內於 48 小時 內服用)
Minlife-P Sustaind tab	Loratadine 5 mg Pseudoephedrine 120 mg	持續性 藥效錠 (子母 錠)	整粒吞服 不可剝半或嚼碎	藥物磨粉後會破壞原 本的劑型(持續性藥效 錠)，喪失藥物長效作 用或導致藥物劑量全 部釋出
Vesicare	Solifenacin succinate 5 mg/tab	膜衣錠	整粒吞服	藥物磨粉後會破壞原 本的劑型(膜衣錠)
Spasmo-Eu vernil	Sulfacarbamide 500 mg Phenazopyridine 50mg	膜衣錠	整粒吞服，不要咀 嚼。	避光儲存，藥物磨粉後 會破壞原本的劑型(膜 衣錠)
Utrogesta n	Progesterone 100 mg/cap	微粒化 軟膠囊	整粒吞服	內含油狀物
Xanthium	Theophylline 200 mg/cap	持續性 藥效膠 囊	整粒吞服，不可磨 粉或嚼碎，但可分 包。(勿打開或壓碎 膠囊內微細顆粒)	藥物磨粉後會破壞原 本的劑型(持續性藥效 膠囊)，喪失藥物長效 作用或導致藥物劑量 全部釋出。
Zinnat	Cefuroxime 250 mg/tab	膜衣錠	整粒吞服，不可壓 碎使用。	藥物磨粉後會破壞原 本的劑型(膜衣錠)。味 苦。

註：Xanthium 可分包，電腦設定未強制管控，其餘均設成不可磨粉，

修訂日 101.11.

## 用藥指導單：

### Carbamazepine 癲通錠

廖翎蚊藥師



商品名：Tegretol Tablet

中文商品名：癲通錠

主成份含量：每錠含有 Carbamazepine 200毫克

#### 作用：

1. 控制癲癇或痙攣。
2. 三叉神經痛。
3. 原發性舌咽神經痛。
4. 其他。

#### 劑量與用法：

1. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或服藥時間，服藥期間請勿吃葡萄柚或飲用葡萄柚汁。
2. 非經醫師指示請勿擅自停藥，突然停藥會引起癲癇發作。

#### 孕婦用藥安全等級：D 級

您已知懷孕或計劃懷孕，carbamazepine 可能會損害您未出生的嬰兒。若您在服用 carbamazepine 時，發現已經懷孕了，請立即告訴您的醫護人員。您和您的醫護人員應決定懷孕後是否應繼續服用 carbamazepine。

**哺乳用藥：**您在哺乳或計畫哺乳，carbamazepine 會進入母乳。您和您的醫護人員應討論是否應服用 carbamazepine 或餵奶，兩者不能併行。

#### 注意事項：

1. 請定期作血液檢查。
2. 初期使用時會讓您覺得頭暈、動作不協調、視線模糊、睏倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動（如開車、騎腳踏車、游泳等）應有人陪同。
3. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
4. 按時回診，假如癲癇繼續發作請與醫師聯繫。確定手邊隨時有足夠的藥量。
5. 孩童服用 carbamazepine 時，請觀察並記錄其行為、情緒、睡覺型態、解決問題及思考能力、癲癇發作情形。
6. 懷孕、計畫懷孕、哺乳，有血液病、青光眼、高血壓、心臟病、血管問題、腎臟

- 病，正在服用其他藥品或曾有藥品不良反應者請先告知醫師。
7. Carbamazepine可能降低避孕藥的效果，請採用其他避孕方式；若有出血現象請與醫師聯繫。
  8. Carbamazepine會使皮膚對光敏感，請儘量避免曬太陽。
  9. 不要讓別人服用您的藥品。
  10. HLA-B 1502檢測為陽性者，不得開立含Carbamazepine成分之處方。

### 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

### 可能的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

**carbamazepine可能引起嚴重的副作用，例如：**

- ✓ 黃疸
- ✓ 腹痛
- ✓ 出血
- ✓ 喉嚨疼痛伴隨發燒情形，
- ✓ 不適
- ✓ 水泡
- ✓ 黏膜糜爛
- ✓ 嘴巴破
- ✓ 廣泛性表皮脫落
- ✓ 眼睛癢
- ✓ 皮膚紅疹等。

☞如果發生以上的副作用，請立刻求治並回診告訴您的醫師或藥師，或是確定有其他人可以幫助您與您的醫師或藥師聯絡。

因為它們可能是血液、肝臟、腎臟或其它器官發生嚴重傷害的早期徵兆，可能需要緊急的醫療處理。