



101年11月
第四卷 第三期

臺安醫院藥訊

Tai-An Hospital Drug Bulletin

發行人：蘇主恩 主編：蕭秀煜 編輯：藥劑科編委會
中華民國 98 年 5 月創刊

本院需冷藏藥品

陳育雯藥師

本期內容

1. 本院需冷藏藥品
2. 本院會引起尿液或其便顏色變化之藥品

一. 疫苗名稱 (商品名)	單位	溫度	注意事項
HEPATITIS-A 720 (Havrix 720) A 型肝炎疫苗	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍, 37°C下可置放 3 星期
HBV (免費&自費) B 型肝炎疫苗(Engerix-B)	20 mcg/mL /Vial	2~8 °C	運送期間需冷藏, 維持在 2~8 °C, 勿冷凍
Tetanus Toxoid(破傷風類毒素)	3 mL/Vial	2~10 °C	避光, 勿冷凍
Adacel inj 白喉、百日咳、破傷風疫苗 (巴斯德三合一補追疫苗 Adacel)	0.5mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
白喉、百日咳、破傷風疫苗加注射小兒麻痺疫苗(巴斯德四合一補追疫苗 Adacel-Polio)	0.5mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
五合一疫苗(白喉、百日咳、破傷風 B 型嗜血桿菌、小兒麻痺疫苗)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
B. C. G VACCINE(卡介苗)	3 mL/Vial	<8 °C	避光貯存。稀釋後於 2 小時內使用, 並持續保冷(2~4 °C)及避光。
Prevenar13 價沛兒 (惠氏廠) 肺炎鏈球菌 13 價接合型疫苗	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
Synflorix 雙伏威 肺炎鏈球菌 10 價接合型疫苗	0.5 mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍
VARICELLA VIRUS VACCINE 水痘疫苗 (Varilrix)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	運送期間需冷藏, 避光貯存, 泡製後於 2~8 °C 可存放 8 小時
流行性感感冒疫苗	0.5 mL/Vial 0.25 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存, 勿冷凍

一. 疫苗名稱 (商品名)	單位	溫度	注意事項
MMR (麻疹、德國麻疹、腮腺炎)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存，勿冷凍，稀釋後於 8 小時內使用
JAPANESE ENCEPHALITIS Vaccine 日本腦炎疫苗	1 mL/Vial	2~10°C	避光貯存，勿冷凍
HPV 嘉喜 (4 價/MSD 廠) 人類乳突病毒基因重組疫苗(Gardasil)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存，勿冷凍
Cervarix 保蓓 (2 價/GSK 廠) (乳突病毒第 16/18 型疫苗)	0.5 mL/Vial	2~8 °C	避光貯存，勿冷凍
ROTA 輪達停 MSD 廠，三劑 口服活性 5 價輪狀病毒疫苗(RotaTeq)	2mL/Dose/ Bot	2~8 °C	運送期間需冷藏，避光貯存
Rotarix 羅特律 GSK 廠，二劑 (人類滅毒活性輪狀病毒疫苗)	1.5mL/Dose/Bot	2~8 °C	運送期間需冷藏，避光貯存 勿冷凍
二. 荷爾蒙製劑 (商品名)	單位	溫度	注意事項
PG-E2 陰道塞劑	3 mg/Tab	2~8 °C	包裝拆封後於 1 個月內使用
OXYTOCIN (大豐)	10 IU/mL/Amp	2~8 °C 以下	
Methyleergometrin	0.2 mg/mL/Amp	2~8 °C	無冷藏且 25°C 以下可存放 14 天
HUMULIN -R 警(Regular Insulin)	1000 IU/10mL/Vial	2~8 °C	勿冷凍，避免陽光直射 使用中不需冷藏，但溫度不能 超過 30°C，一旦使用可最多至 28 天。
三. 血清製劑 (商品名)	單位	溫度	注意事項
HEPATITIS-B IMMUNOGLOBULIN B 型肝炎免疫球蛋白注射液	0.5 mL/Syr	2~8 °C	勿冷凍
RHo(D) IMMUNE GLOBULIN HUMAN 抗 RH 因子球蛋白注射液(Hyper RHO)	1500 IU/Syr	2~8 °C	勿冷凍
四. 口服益生菌 (商品名)	單位	溫度	注意事項
益腹寧 Infloran Berna	20 粒/Box	2~8 °C	避免陽光直射，存放於陰涼處
康敏加強型	40 粒/Box 120 粒/Box	<7 °C	避免陽光直射 存放於陰涼乾燥處
醫敏家	30 粒/Box(長效 型) 40 粒/Box(一般 型)	2~8 °C	避免陽光直射，存放於陰涼處
優芮珂絲 U-relax	20 粒/Box	25°C 以下	避免陽光直射，存放於陰涼處

五 . 泡製後口服抗生素懸浮液	單位	溫度	注意事項
AUGMENTIN 口服懸液用粉劑 Amoxicilline 400mg & Clavulanic acid 57mg	457 mg/5mL, 35 mL/Bot	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 7 天
Amoxicillin 口服懸液用粉劑(Amolin)	125 mg/5mL , 60 mL/Bot	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 7 天
ERYTHROMYCIN ESTOLATE 口服懸液用顆粒劑 (Ulosina)	125 mg/5mL 60 mL/Bot	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 7 天
KEFLEX 口服懸液用顆粒劑 (Ulex)	125 mg/5mL , 60 mL/Bot	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 14 天
ZINNAT 口服懸液用粉劑	125 mg/5mL , 50 mL/Bot	2~8 °C	泡製後於冰箱可存放 10 天
ZITHROMAX 口服懸液用粉 (Azithromycin)	200mg/5mL , 15mL/Bot	30°C 以下	泡製後於室溫可存放 10 天
六 . 其它藥品	單位	溫度	注意事項
Atracurium besylate inj	25mg/2.5mL/Amp	2~8 °C	避光貯存，勿冷凍

修訂日期 101.10.31

本院會引起尿液糞便顏色變化之藥品

陳育雯藥師

■ 正常藥品代謝物

醫令名稱	顏色
Asverin	尿液紅色
Ferrum 100mg/tab, drops	黑便
Pramet 30#/bot	黑便
Solaxin 200mg/tab	橙色尿
Spasmo-Euvern1	尿液紅色

■ 藥品副作用引起，可能需要額外醫療照護

醫令名	顏色
Acyclovir 200mg/Tab	血尿
Aminophylline 100mg/tab	糞便帶血或呈黑焦油色；尿液混濁、排尿增加
Amoxicillin cap	血液便、黏液便
Augmentin tab/susp	結晶尿
Benzbromarone 50mg/tab	血尿→應多喝水，增多尿量，防範尿酸結石
Ceftibuten 100mg/Cap	伴有血便之嚴重大腸炎
Clindamycin 150mg/Cap	糞中帶血、黏液→可能有嚴重結腸炎
Colchicine 0.5mg/tab	血尿、少尿→建議停藥
Diclofenac 25mg/Tab	血尿、黑便
Ibuprofen 400mg/tab	血尿
Indomethacin cap	血尿
Metronidazole 250mg/tab	尿液呈暗色
MgO	血便→建議停藥就醫
Ponstan	血尿
Propofol injection	長期使用會有尿液變色現象，但很罕見
Tegretol 200mg/tab	血尿
Through	會使酸性尿液呈黃、棕色；鹼性尿液呈粉紅色或紫紅色。 血便→建議停藥就醫。
Zithromax 250mg/tab, susp	黑便

參考資料：Drug Information Handbook 15th Edition、藥品仿單 101.11.28